

Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa (DAE) adaptado para COVID-19

COVID-19 *Para profissionais de saúde treinados*

Não responde e não respira normalmente

**Avaliar a respiração visualmente;
não abrir a via aérea nem
se aproximar do nariz e da boca da vítima**

Chamar equipa de SAV

Informe sobre estado COVID-19

**Cobrir o nariz e a boca da vítima
com uma máscara cirúrgica ou um pano**

**Aplicar o DAE assim que disponível, mesmo usando
apenas EPI de precaução contra gotículas**

**Envergar EPI para transmissão por via aérea (se ainda não o tiver);
considerar tamanho ideal da equipa**

Efetuar 30 compressões torácicas

**Efetuar 2 ventilações iniciais
com máscara e insuflador (oxigénio a 100%)**

Não através de boca-a-boca ou boca-a-máscara

Continuar RCP 30:2

Trocar reanimadores a cada 2 minutos

Ventilação com máscara e insuflador:
usar uma técnica de 2 pessoas (uma pessoa garante selagem da máscara, a outra pessoa efetua compressões e ventilações); Colocar um filtro antivírico entre a máscara e o insuflador.

As equipas do SBV menos qualificadas ou desconfortáveis com a ventilação com máscara e insuflador devem colocar uma máscara de oxigénio sobre a face do paciente, administrar oxigénio e efetuar RCP apenas com compressões.